

## تقرير تفشي المرض رقم 3: جائحة فيروس كورونا (COVID-19) 2019

تاريخ الإصدار: 5 مايو 2023

765,222,932 حالة و 6,921,614 حالة وفاة

مصادر البيانات: منظمة الصحة العالمية والدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي


تحديث التفشي: اعتبارًا في 3 مايو 2023، تم الإبلاغ عن إجمالي 765,222,932 حالة COVID-19 و 6,921,614 حالة وفاة ذات صلة (معدل وفيات الحالات: 1 CFR%) من 232 دولة ومنطقة. فيما يلي توزيع الحالات التراكمي (نسبة الحالات العالمية) من مناطق الإبلاغ التابعة لمنظمة الصحة العالمية (باستثناء أفريقيا: منطقة شرق المتوسط 23,352,192 (3%)، المنطقة الأوروبية (41%) 275,974,801، منطقة الأمريكتين (28%) 192,441,131 منطقة جنوب شرق آسيا 61,083,343 (9%) ومنطقة غرب المحيط الهادئ 202,845,604 (17%). في الأيام السبعة الماضية، أبلغت خمس دول عن أكبر عدد من الحالات الجديدة على مستوى العالم هي الولايات المتحدة الأمريكية (86,484)، كوريا (61,874)، اليابان (56,194)، البرازيل (42,186) والهند (37,540). اعتبارًا في 30 أبريل 2023، أكثر من 5 مليار شخص (65% التعداد السكاني في العالم) تلقى التطعيم بالكامل لمزيد من المعلومات التفصيلية عن الحالات والوفيات المبلغ عنها خارج أفريقيا، يرجى الرجوع إلى لوحة معلومات COVID-19 التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

اعتبارًا في الساعة 6 مساءً بتوقيت شرق أفريقيا في 1 مايو 2023، تم الإبلاغ عن إجمالي 12,294,580 حالة و 257,039 حالة وفاة (2.1% CFR) في 55 دولة هم أعضاء الاتحاد الأفريقي (AU). والذي يمثل 2% من جميع الحالات و 4% من جميع الوفيات المبلغ عنها على مستوى العالم. أبلغت ثلاث وأربعون (78%) دولة عضو في الاتحاد الأفريقي عن تقارير إماتة أعلى من الإماتة العالمية. منذ بداية الجائحة (فبراير 2020)، شهدت 53 (96%) من الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي موجة ثالثة، وشهدت 48 (87%) دولة موجة رابعة، وشهدت ثمان وعشرين دولة موجة خامسة من حالات COVID-19 بينما شهدت ست دول موجة سادسة ودولة واحدة وهي كينيا شهدت الموجة السابعة.

أبلغت 53 دولة عضو في الاتحاد الأفريقي (الشكل 2) عن وجود متغيرات جديدة؛ 50 دولة عضو أبلغت عن ألفا، بينما 45 دولة عضو أبلغت عن بيتا، 53 دولة عضو أبلغت عن متغير دلتا بينما أبلغت ثلاث دول عن متغير جاما و أبلغت 52 دولة عضو عن وجود متحور أوميكرون.

بالإضافة لذلك قد أبلغت 32 دولة عن المتحور 2.BA وقد أبلغت عشر دول عن المتحور أوميكرون (XBB.1.5) و اثني عشر دولة أبلغت عن وجود المتحور(BF.7) أو 5.2.1.7.BA) بينما أبلغت دولتان عن وجود المتحور أوميكرون ( XBB.1.16) . توفر لوحة معلومات متابعة التحورات الجينية لفيروس الكورونا تفصيلاً أنواع المتغيرات التي أبلغت عنها الدول الأعضاء. مزيد من المعلومات حول تسلسل SARS-COV-2 في أفريقيا متاحة على الرابط [Africa Pathogen Genomics Initiative Dashboard](#).

أربع وخمسون (98%) من أصل 55 دولة عضوًا في الاتحاد الإفريقي بدأوا حملات تطعيم ضد الكورونا تستهدف جميع الفئات السكانية. وبشكل تراكمي، تم إعطاء 1.1 مليار جرعة في القارة. من بين هذه الجرعات التي تم إعطاؤها، تم تطعيم 546.5 مليون شخص جزئيًا، وتم تطعيم 431.7 مليون شخص بالكامل. بشكل عام، تم تحصين 46% من سكان القارة بشكل كامل. إريتريا هي الدولة الوحيدة في الاتحاد الأفريقي التي لم تبدأ بعد إطلاق لقاح COVID-19. يمكن العثور على مزيد من المعلومات حول لقاح COVID-19 على لوحة معلومات [لقاح COVID-19 Africa CDC](#)



الشكل 1: حالات الإصابة الجديدة بـ COVID-19 التي تم الإبلاغ عنها أسبوعياً في أفريقيا من قبل منطقة الاتحاد الأفريقي، 15 فبراير 2020 حتى 30 أبريل 2023.

<sup>1</sup> اعتباراً من 21 ديسمبر 2022 ، يتم حساب النسبة المئوية التي تم تلقيحها في إفريقيا باستخدام السكان البالغين من العمر 12 عامًا وأكبر كمقام.

بالنسبة للأسابيع الوبائية 13 - 17<sup>2</sup> 2023، (2 - 30 أبريل 2023)<sup>3</sup> : تم الإبلاغ عن 11,378 حالة إصابة جديدة بـ COVID-19 في أفريقيا. استحوذت المنطقة الجنوبية على 57% من حالات الإصابة الجديدة بـ COVID-19 المبلغ عنها في الأربع أسابيع الماضية، تليها المنطقة الشمالية (19%) والشرقية (10%) والوسطى (9%) والغربية (5%).

في الأسابيع الوبائية 13 - 17، 2023، تم الإبلاغ عن 60 حالة وفاة جديدة في أفريقيا. تم الإبلاغ عن 55% حالة وفاة من هذه الوفيات من المنطقة الشمالية<sup>4</sup>، تليها المنطقة الجنوبية (27%) والمنطقة الوسطى (12%) والمنطقة الشرقية (3%) والمنطقة الغربية (3%). الإجماليات التراكمية لحالات COVID-19 والوفيات والحالات الجديدة والوفيات التي تم الإبلاغ عنها خلال الأسابيع الوبائية 13 - 17، 2023 من قبل الدول الأعضاء في الإتحاد الأفريقي ملخص في الجدول 1.

تم إجراء أكثر من 337 ألف اختبار COVID-19 في أفريقيا في الأسابيع الأربعة الماضية. منذ فبراير 2020، تم إجراء أكثر من 126.4 مليون اختبار COVID-19 في إفريقيا. يمكن العثور على مزيد من المعلومات حول الحالة الوبائية في أفريقيا على لوحة معلومات [تحديثات كورونا اليومية](#) و [لوحات النقاط الساخنة](#).

الجدول 1. العدد والنسبة المئوية لحالات COVID-19 المؤكدة والوفيات المبلغ عنها في أفريقيا منذ فبراير 2020 بالنسبة للأسابيع الوبائية 13 - 17 (2 - 30 أبريل 2023) من قبل الدول الأعضاء في الإتحاد الأفريقي.

الدولة	العدد التراكمي للحالات (حالات جديدة)	عدد الوفيات (جديدة)
المنطقة الوسطى	402,135 (838)	4,712 (7)
بوروندي	53,686 (70)	15 (0)
الكاميرون	124,741 (216)	1,970 (5)
جمهورية إفريقيا الوسطى	15,382 (11)	113 (0)
تشاد	7,688 (132)	194 (0)

<sup>2</sup> هذا تقرير شهري موجز عن تفشي فيروس COVID-19 خلال الأسابيع الأربعة الماضية.

<sup>3</sup> يتم تحديث عدد الحالات والوفيات الجديدة حيث يتلقى مركز مكافحة الأمراض في إفريقيا هذه المعلومات وقد لا يعكس إجمالي الحالات والوفيات الجديدة وفقًا لتاريخ التقرير الموجز للتفشي.

<sup>4</sup> بسبب الإبلاغ عن 25 حالة وفاة من تونس خلال الأسابيع الأربعة الماضية

عدد الوفيات (جديدة)	العدد التراكمي للحالات (حالات جديدة)	الدولة
389 (1)	25,143 (82)	الكونغو
1,464 (0)	95,959 (459)	جمهورية الكونغو الديمقراطية
183 (0)	17,130 (0)	غينيا الإستوائية
307 (1)	48,981 (1)	الجابون
77 (0)	12,577 (0)	ساو تومي وبرينسيبي
<b>27,689 (2)</b>	<b>1,496,415 (1,082)</b>	المنطقة الشرقية
161 (0)	9,080 (102)	جزر القمر
189 (0)	15,961 (1)	جيبوتي
103 (0)	10,190 (0)	إريتريا
7,574 (2)	500,564 (359)	أثيوبيا
5,688 (0)	342,976 (82)	كينيا
1,419 (0)	68,049 (270)	مدغشقر
1,032 (0)	41,642 (0)	موريشيوس
1,468 (0)	133,199 (0)	رواندا
172 (0)	50,937 (0)	سيشيل
1,361 (0)	27,334 (39)	الصومال
138 (0)	18,368 (0)	جنوب السودان
3,909 (0)	63,922 (94)	السودان
845 (0)	42,942 (46)	تنزانيا
3,630 (0)	170,491 (89)	أوغندا
<b>84,919 (33)</b>	<b>3,787,125 (2,238)</b>	المنطقة الشمالية
6,881 (0)	271,584 (153)	الجزائر
24,826 (7)	515,882 (118)	مصر
6,437 (0)	507,206 (44)	ليبيا

عدد الوفيات (جديدة)	العدد التراكمي للحالات (حالات جديدة)	الدولة
997 (0)	63,668 (302)	موريتانيا
16,297 (1)	1,272,622 (841)	المغرب
29,387 (25)	1,151,832 (780)	تونس
90 (0)	2,148 (0)	الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية
<b>128,206 (16)</b>	<b>5,722,204 (6,521)</b>	المنطقة الجنوبية
1,928 (0)	104,973 (0)	أنجولا
2,787 (0)	328,190 (0)	بوتسوانا
1,425 (0)	74,323 (304)	إيسواتيني
709 (0)	35,501 (0)	ليسوتو
2,686 (0)	88,565 (0)	ملاوي
2,243 (1)	233,369 (75)	موزمبيق
4,088 (0)	170,724 (0)	ناميبيا
102,595 (0)	4,073,207 (5,393)	جنوب أفريقيا
4,058 (1)	343,668 (351)	زامبيا
5,684 (14)	264, 535 (398)	زمبابوي
<b>11,513 (2)</b>	<b>886,561 (560)</b>	المنطقة الغربية
163 (0)	27,982 (0)	بنين
395 (0)	22,006 (0)	بوركينافاسو
415 (2)	63,260 (164)	كابوفيردي
834 (0)	88,301 (26)	كوت ديفوار
372 (0)	12,586 (45)	جامبيا
1,462 (0)	171,412 (212)	غانا
805 (0)	38,321(0)	غينيا
176 (0)	8,848 (0)	غينيا بيساو

عدد الوفيات (جديدة)	العدد التراكمي للحالات (حالات جديدة)	الدولة
294 (0)	8,043(7)	ليبيريا
743 (0)	33,112 (36)	مالي
315 (0)	9,504 (9)	النيجر
3,155 (0)	266,463 (0)	نيجيريا
1,968 (0)	88,972 (17)	السنغال
126 (0)	7,760 (0)	سيراليون
290 (0)	39,450 (44)	توجو
<b>257,032 (60)</b>	<b>12,294,580 (11,378)</b>	<b>إجمالي</b>

\* لم يتم الإبلاغ عن حالات / وفيات جديدة في الأسبوع السابق.

أنشطة الاستجابة الجديدة لمركز مكافحة الأمراض والوقاية منها في إفريقيا (ACDC):

الأنشطة العلمية والمعايير واللوائح:

1. اشترك [هنا](#) لتلقي التحديث الأسبوعي للشراكة من أجل الاستجابة المستندة إلى الأدلة لـ (COVID-19 PERC) وجميع المنتجات الأخرى أو قم بزيارة موقع [PERC](#) و [Africa CDC website](#).
2. قم بالوصول إلى أحدث تقرير PERC حول "الاستجابة لـ COVID-19 في إفريقيا: ايجاد التوازن (الجزء الرابع) والدعوات إلى العمل" [هنا](#).

توصيات للدول الأعضاء:

1. لتحقيق معدلات تغطية التطعيم العالمية البالغة 70٪ ، يجب على الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي الاستمرار في تنظيم وتنفيذ حملات التطعيم ضد فيروس كورونا COVID-19 ، مع التركيز على زيادة [الأهلية](#)<sup>5</sup> والطلب ، مع معالجة المعلومات الخاطئة.
2. أن تنفيذ إجراءات الصحة العامة والتدابير الاجتماعية (PHSM) مستهدف ومستنير بالوضع الحالي لـ COVID-19 ، يجب على الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي وضع نظام PHSM متدرج.

3. ينبغي على جميع الدول الأعضاء أن تواصل تعزيز ترصدها COVID-19<sup>6</sup> لتشمل:
- أ. الترصد المجتمعي<sup>7</sup> للكشف المبكر عن الحالات المصحوبة بأعراض لتقليل انتقال الفيروس. حيثما أمكن، يمكن استخدام اختبارات المستضدات السريعة<sup>8</sup> والاختبار الذاتي لتعزيز<sup>9</sup> جهود الفحص التشخيصي.
  - ب. الترصد السريع للوفيات الذي يشمل جمع وتحليل واستخدام معطيات الوفيات الناجمة عن جميع الأسباب التي تم جمعها من خلال الترصد المرتكز على المرافق الصحية أو المجتمع<sup>10</sup>.
  - ج. المراقبة الجينومية<sup>11</sup> لرصد وجود المتغيرات وانتشار الفيروس وتطوره المستمر.
  - د. المراقبة المتلازمة للأمراض الشبيهة بالإنفلونزا (ILI) والتهابات الجهاز التنفسي الحادة الوخيمة (SARI)<sup>12</sup>.
4. تُشجع الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي على:
- أ. استمر في تتبع جهات الاتصال حيثما كان ذلك ممكنًا بناءً على الوضع الوبائي الحالي وقدرة الدولة.
  - ب. قم بتوجيه الجمهور حول طلب الرعاية الطبية الفورية للأفراد الذين تظهر عليهم أعراض حادة لـ COVID-19 (مثل صعوبة التنفس).
  - ج. إشراك علماء الاجتماع للمساعدة في إعلام وتعزيز حملات التطعيم وتنفيذ PHSM.
5. يجب على الدول الأعضاء إخطار وتبادل البيانات بشكل روتيني فيما يتعلق بحالات COVID-19 المؤكدة والوفيات والتعافي والاختبارات التي أجريت والعاملين في مجال الرعاية الصحية المصابين بمنظمة الصحة العالمية ومركز مكافحة الأمراض في إفريقيا لإبلاغ هذه التحديثات وغيرها باستمرار. أبلغ مركز مكافحة الأمراض في إفريقيا عن طريق البريد الإلكتروني: [AfricaCDCEBS@africa-union.org](mailto:AfricaCDCEBS@africa-union.org)

#### مصادر لمزيد من المعلومات :

##### مصادر المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض (ACDC)

- <https://africacdc.org/covid-19/> : المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض تحديثات كورونا
- استراتيجية القارة الأفريقية المشتركة وباء الكورونا: <https://africacdc.org/download/adapted-africa-joint-continental-strategy-for-covid-19-pandemic/>
- الموارد وإرشادات السياسة والرسوم البيانية : <https://africacdc.org/covid-19/covid-19-resources/>
- لوحات التحكم النقاط الساخنة و الصحة العامة والتدابير الاجتماعية لمركز السيطرة على الأمراض في إفريقيا <https://africacdc.org/covid-19/>
- لوحة التحكم في التطعيم في إفريقيا: <https://africacdc.org/covid-19-vaccination/>

<sup>6</sup> منظمة الصحة العالمية تعريف حالة COVID-19

<sup>7</sup> تعزيز مراقبة COVID-19 على مستوى المجتمع في إفريقيا

<sup>8</sup> إرشادات مؤقتة حول استخدام اختبارات المستضد السريع للاستجابة لـ COVID-19 - مركز مكافحة الأمراض في إفريقيا

<sup>9</sup> إرشادات مؤقتة حول استخدام اختبارات المستضد السريع للاستجابة و الاختبار الذاتي لـ COVID-19 - مركز مكافحة الأمراض في إفريقيا

<sup>10</sup> الكشف عن حصيلة COVID-19: حزمة فنية للدول الأعضاء - المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها

<sup>11</sup> التوجيه التشغيلي المؤقت بشأن المراقبة الجينية لـ SARS-CoV-2 في إفريقيا: دليل محدث

<sup>12</sup> بروتوكول لتعزيز أمراض الجهاز التنفسي الحادة الشديدة والأمراض الشبيهة بالإنفلونزا لـ COVID-19 في إفريقيا - مركز مكافحة الأمراض في إفريقيا

- لوحة معلومات الجينوميّات المسببة للأمراض في إفريقيا:  
<https://africacdc.org/institutes/africa-pathogen-genomics-initiative>
- الشراكة من أجل الاستجابة القائمة على الأدلة لـ (COVID-19 PERC)  
<https://preventepidemics.org/covid19/perc/>
- إرشادات منظمة الصحة العالمية التقنية لـ [https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-](https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance)  
[coronavirus-2019/technical-guidance](https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance)